

## Памятка

о вакцине «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2

Вакцина «Гам-Ковид-Вак» (далее Спутник V) представляет собой раствор для внутримышечного введения и не содержит опасного для человека коронавируса, способного привести к заражению и развитию болезни.

Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Защитный иммунитет к коронавирусу формируется через 42 дня после введения первого компонента вакцины и через 21 день после введения второго компонента.

Вакцинация с применением вакцины Спутник V проводится на добровольной основе гражданам в возрасте старше 18 лет, не имеющим медицинских противопоказаний.

**Показания к вакцинации:** профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет.

### **Временные противопоказания к вакцинации**

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний.

Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления от острой инфекции или начала ремиссии.

При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ-допускается проведение вакцинации после нормализации температуры.

### **Постоянные противопоказания к вакцинации:**

- гиперчувствительность (тяжелые аллергические реакции в анамнезе) к компонентам вакцины или вакцин, содержащих аналогичные компоненты;
- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°C и т.д.) на введение компонента I вакцины;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.

Переболевшие COVID-19 и лица, имеющие положительные результаты ранее выполненного исследования на наличие антител классов G и M к коронавирусу, не прививаются.

### **Общие сведения о вакцинации для привитых.**

После введения первого компонента вакцины Спутник V у 7-10% привитых возможно развитие общих и местных реакций в первые 24 часа после прививки, которые полностью проходят в течение 3х последующих дней.

Общие реакции: гриппоподобный синдром (повышение температуры тела, головная боль, головокружение, мышечные и суставные боли, сонливость, слабость).

Местные реакции: болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность.

Появляющиеся симптомы не требуют специального лечения.

### **Запись на вакцинацию.**

Записаться на вакцинацию возможно на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), через региональный портал [medregtver.ru](http://medregtver.ru), номер 122 в Едином диспетчерском центре и по выделенным телефонам медицинских организаций.